

CWS – Empfehlung für Kontrolluntersuchungen bei lokalisierten embryonalen Rhabdomyosarkomen ≤5cm)

Patient:

Zeitpunkt	Untersuchungen im Bereich der Primärlokalisierung	Staging	Zusätzliche Untersuchungen
im 1. Jahr nach Therapieende	Sonografie (Tumorregion, regionale Lymphknoten, Abdomen, Pelvis) MRT/CT mit Kontrastmittel (alle 4 Monate ; möglichst alternierend)	Rö-Thorax oder CT Thorax (Intervalle risikoadaptiert, mind. alle 6 Monate) Sonografie Abdomen/Pelvis (mind. alle 6 Monate)	Leber- und Nierenfunktion (glomerulär und tubulär) Echokardiogramm/ 24h-EKG
2. Jahr	siehe oben, alle 6 Monate	s.o., Rö-Thorax alle 6 Monate Sonografie Abdomen/Pelvis (mind. alle 6 Monate)	Hormonstatus (Wachstum und Pubertätsentwicklung)
3.-5.- Jahr	siehe oben, alle 6-12 Monate	siehe oben, jährlich	Funktionelle Beeinträchtigung (Kontinenz, Seh- u. Hörvermögen; muskuloskelettales System)
nach dem 5. Jahr	Sonografie oder MRT mit Kontrastmittel (Häufigkeit nach Einschätzung des verantwortlichen Arztes)	siehe oben, (Häufigkeit nach Einschätzung des verantwortlichen Arztes oder im Falle klin. Symptomatik)	Weitere Untersuchungen in Abhängigkeit der klin. Symptomatik

Quelle: CWS-Guidance